



Megbízható védelem kukoricabogár lárvák és drótférgek ellen kukoricában, napraforgóban

- Hosszú hatástartam.
- Taglózó hatású hatóanyag.
- Táplálkozásgátló, kártevőriasztó hatás.
- Száraz talajban is hatékony.

Teflix™

TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZER


A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



Megbízható védelem kukorica bogár lárvák és egyéb talajlakó kártevők ellen.



Kukoricabogár imágó (nőstény)



Kukoricabogár lárvák a gyökérszeten



Drótféreg kártétel kukoricán 2021. június 4.



Drótféreg a kukorica gyökerénél 2021. június 4.

- Kiemelkedő hatékonyság az amerikai kukoricabogár lárvája ellen
- Tartós hatás drótféreg és más talajlakó kártevők ellen
- Gázosodó hatás a talajban
- Száraz talajban is hatékony

HATÁSMECHANIZMUS

A **Teflix™** hatóanyaga a teflutrin a piretroid típusú rovarölőszerek csoportjába tartozik, hatását a rovarokra fejti ki. Melegvérűekre nem mérgező. A rovarok érintkezés és belégzés útján veszik fel. Azok idegrendszerére hat, az idegsejtekben lévő nátrium-csatornák működését befolyásolja, ezáltal folyamatos ingerületi állapotba hozva az idegsejteket. Ez túlzott, kontrollálatlan mozgásokat eredményez, ami rövid időn belül a rovar pusztulásához vezet.

A **Teflix™** hatóanyaga csak az ízeltlábúakra hat, az emberre nem, csökkentve ezáltal a felhasználók veszélyeztetettségét.

A növényekbe nem szívódik fel a hatóanyag, viszont jelentős gázosodó képessége van. Ezzel a tulajdonsággal a hatás területe kibővül a csíranövény körül. A **Teflix™** képes megakadályozni a kultúrnövény károsodását azzal is, hogy a kártevők pusztulásuk előtt nem fogyasztanak belőle. A gázhatás, valamint a hatóanyag csökkent koncentrációja a célszervezeteket elriasztja, táplálkozásgátlást okoz. A teflutrin más talajfertőtlenítésre használt hatóanyagokkal összehasonlítva hosszabb ideig marad aktív a kijuttatás zónájában, biztosítva a hosszan tartó hatást. Vízoldékonysága nagyon kicsi, viszont zsírszerű anyagokban jól oldódik, ami nagyban segíti a talajrészecskékhez és humuszhoz való kötődését. A **Teflix™** különlegessége, hogy száraz talajban is kifejti védő, rovarölő hatását. A talajba jutó nagy mennyiségű csapadék hatására sem mozdul el a kijuttatási zónából és nem csökken a hatástartam sem.

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLOGIA

A **Teflix™** kijuttatása a vetéssel egy menetben, sorkezelés formájában kell történnjen. A kijuttatás során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a talajfertőtlenítő szer a magot a talajban a lehető legjobban körülvegye 5-8 cm-es körzetben, biztosítva a kártevővel való találkozást.

Minden esetben ellenőrizni kell a mikrogranulátum szóró elemek állapotát a

jó működés és az egyenletes dozírozás érdekében!

Kijuttatása előtt minden esetben javasolt a mikrogranulátum szóró adagolásának előzetes ellenőrzése leforgatással.

Külön figyelemmel kell lenni arra, hogy a kijuttatáskor a **Teflix** teljes mennyisége a talaj felszíne alá kerüljön! Amennyiben a talaj felszínén is marad a termékből, azt maradéktalanul össze kell gyűjteni!

Az amerikai kukoricabogár lárvájának kelését a tavaszi időszak hőösszege szabályozza. A fertőzött területeken célszerű kerülni az extrém korai vetést annak érdekében, hogy a talajfertőtlenítő szer kijuttatása a lehető legjobban közelítse a lárvakelés időpontját. Ezáltal annak hatástartama biztosítani tudja a lárvák elleni megfelelő hatékonyságot. Kukoricabogár lárvá elleni védelemre minden esetben a maximális dózis használatát javasoljuk.

NÖVÉNYBIZTONSÁG

A Teflix[®] használata után nincs korlátozás a szulfonil-urea csoportba tartozó hatóanyagokat tartalmazó gyomirtó szerek használatát illetően. A Teflix[®] a kukorica növényvédelmi technológiájának egyéb elemeit sem befolyásolja hátrányosan.



A kukoricabogár imágók kártétele közvetlen termésvesztést is okozhat



A gyökérzet károsodása megdőlést eredményez, nehezítve ezáltal a betakarítást.



Kultúra	Károsító	Kezelések max. száma	Dózis
Kukorica	Amerikai kukoricabogár lárvá, drótférgek (pattanó bogár lárvák)	2 évente egyszer	7-12 kg/ha
Napraforgó	Drótférgek (pattanó bogár lárvák)	2 évente egyszer	7-10 kg/ha

Hatóanyag: 15 gramm/kg teflutrin

Formuláció: mikrogranulátum (GR)

Forgalmazási kategória: II.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Kiszerezés: 10 kg

Új talajfertőtlenítő granulátum

- Kiemelkedő hatékonyság az amerikai kukoricabogár lárvája ellen
- Tartós hatás drótféreg és más talajlakó kártevők ellen
- Gázosodó hatás a talajban
- Száraz talajban is hatékony

