

CÍMKESZÖVEG

Információk, magyarázatok	Címkén feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve	Encarit®
Szerforma (formuláció)	Emulzióképző koncentrátum (EC)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)	A növényvédő szer hatóanyaga: 720 g/l (65,5 m/m %) dimetenamid-p
Az Encarit® azonos a 873/2005. NTKSZ számon engedélyezett Spectrum® gyomirtó permetezőszerrel.	
Rendeltetése a felhasználás célja szerint, engedélyezett kultúrák megnevezésével (mondattal)	gyomirtó permetezőszer Felhasználható: kukorica (takarmány), napraforgó, szója, cukorrépa kultúrákban magról kelő egyszikű gyomnövények ellen
Forgalomba hozatali engedély száma (Az engedélyokirat kiadásakor kapott határozat számának szerepeltetése kötelező, a többi feltüntethető; a helyes sorrend: sorszám, majd az engedélyt kiállító hatóság rövidítése)	Engedélyszám: 04.2/4419-2/2018. NÉBIH
Forgalmazási kategória megjelölése	Forgalmazási kategória: 200 ml-es kiszerelés felett: II. 200 ml-es kiszerelésben: III
Az engedélyokirat tulajdonosa (név, cím, telefonszám)	A növényvédő szer gyártója, az engedély tulajdonosa: BASF S.E. D-67056 Ludwigshafen, Németország Carl Bosch str. 38. Telefon: +49 180 2273-112
A növényvédő szer gyártója (név, cím)	
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője, vagy címkéért felelős személy az 547/2011 EU rendelet alapján (név, cím, telefonszám) (válasszon)	Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: BASF Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Forgalmazó (név, cím, telefonszám) Akkor is fel kell tüntetni, ha nem mi vagyunk	Forgalmazó: Corteva Crop Solutions HUN Kft 1112 Budapest, Boldizsár utca 4.
Gyártási idő (nap, hó, év, vagy év, hó, nap) válasszon Gyártási szám	Gyártási szám (lásd a címkén/csomagolóeszközön) Gyártás dátuma (lásd a címkén/csomagolóeszközön)
Kiszerelő (csak akkor feltüntetendő amennyiben hazai kiszerelés történik) (név, cím, telefonszám) Kiszerelés ideje (: dátum: év/hó, vagy hó/év, vagy szöveg, például: „A csomagolóeszközön található.”)	
Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Kiszerelési egység (valamennyi kiszerelési egység feltüntetendő)	Nettó tartalom: 200 ml, 1 liter, 5 liter

**EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ
VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS
FELTÉTELEI**

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelem

Figyelmeztetés

H-, P- és különleges S-mondatok és Kiegészítő veszélyességi információk (EUH401-es mondatot a címke elején kérjük feltenni a kód nélkül; lásd: kötelezően feltüntetendő mondatok alább)

(Abban az esetben, ha készítmény besorolása H mondatot nem tartalmaz, akkor a címkeszövegen nem feltüntetendő a címsor.

A P102, P270 mondatok az I. és a II. forgalmi kategóriák esetében választhatóak, de III. forgalmi kategória esetén kötelező feltüntetni. Amennyiben az engedélyokiratban lévő munkaegészségügyi előírások lefedik az adott P mondatot, akkor az elhagyható.)

Egyéb környezetvédelmi előírások: Ha nincs egyéb környezetvédelmi előírás, a következő mondatot kell szerepeltetni: „Az előirt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.”

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): 1581 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmatlan.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 +P330 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. A száját ki kell öblíteni.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S-mondatok

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközzel ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **10m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

<p>Munkaegészségügyi óvórendszabályok</p>	<p>Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védőfelszerelés: Előkészítőknak és kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Elsősegélynyújtás, terápia: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs</p>									
<p>Várakozási idők (napokban megadva)</p>	<p>Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:</p> <table border="1" data-bbox="730 723 1481 956"> <thead> <tr> <th>kultúra</th> <th>várakozási idő</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kukorica (takarmány)</td> <td>90 nap</td> </tr> <tr> <td>napraforgó</td> <td rowspan="2">előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges</td> </tr> <tr> <td>szója</td> </tr> <tr> <td>cukorrépa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	kultúra	várakozási idő	kukorica (takarmány)	90 nap	napraforgó	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	szója	cukorrépa	
kultúra	várakozási idő									
kukorica (takarmány)	90 nap									
napraforgó	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges									
szója										
cukorrépa										

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	A kezelések között eltelt minimális idő	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
kukorica (takarmány)	magról kelő egyszikű gyomnövények	1	–	1,0-1,4	250-300	vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)
				1,4		1 leveles állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 11-13)
napraforgó, szója	magról kelő egyszikű gyomnövények	1	–	1,0-1,4	250-300	vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)
cukorrépa	magról kelő egyszikű gyomnövények	1	–	1,2	250-300	vetés után kelés előtt (BBCH 00-08)
		1	–	1,0		szikleveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 10-14)
		2	8-12 nap	osztott kezelés formájában: 1. kezelés: 0,6 2. kezelés: 0,4		

Házi kerti felhasználás esetén a 100 m²-re jutó dózis:

Kukorica (takarmány), napraforgó, szója: **10-14 ml szer / 3 liter permetlé**

Cukorrépa: **10-12 ml szer / 3 liter permetlé**

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény kukoricában, napraforgóban és szójában egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal, cukorrépában preemergens kijuttatás esetén egy vegetációs időszakban csak egy, cukorrépában posztemergens kijuttatás esetén 1,0 l/ha-os dózisban kijuttatva egy vegetációs időszakban csak egy, osztott kezelés esetén két alkalommal használható!

Kukoricában (takarmány) a készítmény kijuttatható a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen), amíg a kultúrnövény csírái 1-2 cm mélyen a talajfelszín alatt vannak, vagy korai posztemergensen, a kultúrnövény 1 leveles állapotától 3 leveles állapotáig, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles fenológiai stádiumában. Magról kelő kétszikű gyomnövények ellen a kukoricában hasonló technológiát igénylő kétszikű spektrumú készítménnyel kombinációban kell alkalmazni.

Napraforgóban vetés után kelés előtt (preemergensen) kell kijuttatni. Magról kelő kétszikű gyomnövények ellen napraforgóban engedélyezett kétszikű spektrumú készítménnyel kombinációban kell kijuttatni, vagy Clearfield/Clearfield Plus technológiában, IMI toleráns napraforgó fajta vetése esetén, állományban imazamox hatóanyagú készítmény engedélyezett dóziséval felül kell kezelni.

1,5 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon tilos a szert alkalmazni!

Szójában a kultúrnövény vetése után kelés előtt (preemergensen) kell felhasználni.

Cukorrépában magról kelő egyszikű gyomnövényekkel erősen fertőzött területen, vetés után kelés előtt (preemergensen) 1,2 l/ha (12 ml/100 m²) dózisban, vagy magról kelő egyszikű gyomnövényekkel kevésbé fertőzött területen posztemergensen a cukorrépa szik-, illetve 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles állapotában, egy menetben 1,0 l/ha (10 ml/100 m²) dózisban, vagy osztott kezelés esetén az első kezelés során 0,6 l/ha (6 ml/100 m²), az első kezelést követően 8-12 napon belül 0,4 l/ha (4 ml/100 m²) dózisban kell kijuttatni. Magról kelő kétszikű gyomnövények ellen kombinációban kell alkalmazni.

Laza talajokon az alacsonyabb, szervesanyagban gazdag, kötöttebb talajokon a magasabb dózisban kell felhasználni.

A dimetenamid-P hatóanyag a HRAC „K3”, fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül a klóracetanilid hatóanyagcsoportba tartozik.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén:

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen


A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

**GYÁRTÓI AJÁNLÁS****A gyártó közleménye:**

Különböző tájegységi vagy helyi tényezők befolyásolhatják a növényvédő szerek hatását. Ilyenek pl. az időjárási- és talajviszonyok, a kultúrnövények fajtája, a vetésforgó, a kezelés ideje, felhasználási mennyiség, más termékekkel történő kombináció, a hatóanyagra rezisztens szervezetek (pl. gombák, növények, rovarok), fellépése vagy a kijuttatási technika. Különösen kedvezőtlen körülmények esetén mindez a termék hatékonyságának változását okozhatja, de nem kizárható a kultúrnövények károsodása sem. Mindezekre sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal. Különösen kedvezőtlen körülmények esetén nem zárható ki a termék hatékonyságának megváltozása. Az engedélyokiratban előírt felhasználási dózisokat pontosan be kell tartani.

® = a BASF S.E: védjegyzett márkaneve

400 ML/G ALATTI KISZERELÉSEK ADATKÖVETELMÉNYE

Azonosítási adatok	Címkén feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve és szerforma	Encarit Emulzióképző koncentrátum (EC)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)	A növényvédő szer hatóanyaga: 720 g/l (65,5 m/m %) dimetenamid-p
<i>Az Encarit® azonos a 873/2005. NTKSZ számon engedélyezett Spectrum® gyomirtó permetezőszerszel.</i>	
(A frontoldalon kell szerepeltetni az okiratban megadott méretben.)	
Rendeltetése	gyomirtó permetezőszer Felhasználható: kukorica (takarmány), napraforgó, szója, cukorrépa kultúrákban magról kelő egyszikű gyomnövények ellen
Engedély száma:	Engedélyszám: 04.2/4419-2/2018. NÉBIH
Engedély tulajdonosa Forgalmazó Kiszerező	A növényvédő szer gyártója, az engedély tulajdonosa: BASF S.E. Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: BASF Hungária Kft. Forgalmazó: Corteva Crop Solutions HUN Kft
Gyártási idő (nap, hó, év) Kiszerezési idő (nap, hó, év)	Gyártási idő:
Gyártási szám	Gyártási szám:
Veszélyt jelző piktogramok és Figyelem/Veszély	 Figyelem
Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Kiszerezési egység	200 ml
Forgalmi kategória	Forgalmi kategória: III.
<i>Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!</i>	