

IKARUS

AZONOSÍTÁSI ADATOK	
Növényvédő szer neve	Ikarus
Szerforma (formuláció)	Folyékony, vízdoldható koncentrátum (SL)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve)	klopiralid 240 g/l (20,3 m/m %) pikloram 80 g/l (6,8 m/m %) aminopiralid 40 g/l (3,4 m/m %)
Rendeltetése a felhasználás célja szerint (mondat)	folyékony gyomirtó permetezőszer ŐSZI KÁPOSZTAREPCE MAGRÓL KELŐ ÉS ÉVELŐ KÉTSZIKŰ GYOMNÖVÉNYEI ELLEN.
Forgalomba hozatali engedély száma	02.5/334/5/2008 MgSzhK
Forgalmazási kategória	II.
Az engedélykiirat tulajdonosa és forgalmazója	Dow AgroSciences Hungary Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Tel: (36-1)-202-4191
A növényvédő szer gyártója	Diachem S.P.A, Olaszország ill. Dow AgroSciences S.A., Drusenheim, Franciaország
Kiszerező	-
Gyártási idő (nap, hó, év) Gyártási szám	A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság	Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év .
Nettó tartalom	1, 3 és 5 liter

KÖTELEZŐ MONDATOK

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199,

CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen. Tel.: +36 1 340 5411
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:

<p>Veszélyt jelző piktogrammok, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok</p>	<p>Piktogram:</p> <p>nem jelölésköteles</p> <p>A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/kg.</p> <p>Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles Méhveszélyesség: nem jelölésköteles</p> <p>P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.</p> <p>SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)</p> <p>SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken és drénezett talajokon ne használja!</p> <p>SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!</p> <p>Egyéb környezetvédelmi előírások:</p> <p>A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni.</p>
<p>Munkaegészségügyi óvórendszabályok:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Egyéni védőfelszerelés <p>Az alkalmazás során előírt egyéni védőeszközök <i>előkészítőknak</i> és <i>kijuttatóknak</i>: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű (3. kategória), védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.</p> <p>Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor allergiás megbetegedéskor vagy annak gyanújakor a munkát félbe kell szakítani majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terápia: tüneti megfigyelő kezelés Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
<p>Várakozási idők:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
		szer mennyiség l/ha	víz mennyiség l/ha	
Őszi káposztarepce	magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények	0,3 l/ha	200-300 l/ha	szárbaindulás kezdeté BBCH 31

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítményt őszen a repce **2-4** leveles fenológiai állapotától, vagy tavasszal közvetlenül a nyugalmi időszak után szárbaindulás kezdetéig kell kijuttatni. A jó hatékonyság érdekében fontos, hogy a kezeléskor a léghőmérséklet **+ 10** fok felett legyen. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a ragadós galaj 1-3 levélörvös állapotában, a mezei acat a tölevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre.

Nedvesítőszer hozzáadása **nem** javasolt.

Betakarítást követően a kezelt területre őszen csak kalászos gabona vethető, következő tavasszal kalászosok és kukorica kultúrák kerülhetnek.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

A készítmény kiváló hatékonysággal alkalmazható a kék búzavirág, mezei csorbóka, ebszikfű, mezei acat, parlagi pipitér, orvosi szikfű (székfű), tarka kenderkefű, gyakori gombvirág, fekete csucor ellen.