

DUPONT

VICTUS® 40 OD

olajos diszperzió (OD)

hatóanyag: 40 g/l (4,2 % m/m) nikoszulfuron

Széles hatásspektrumú gyomirtó szer áru- és silókukorica gyomirtására az évelő és magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyomnövény ellen.

Kizárólag a DuPont-tól !

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

A készítmény gyártója:

DuPont International Operations S.a.r.l., 2, Chemin du Pavillon, Le Grand Saconnex, Geneva, CH-1218 Svájc

Forgalmazza és az engedély tulajdonosa:

DuPont Magyarország Kft. 06/23-509-400
2040 Budaörs, Neumann János u.1.

Engedélyokirat száma: MgSzHK 02.5/900/1/2010.

Forgalmi kategória: I.

Gyártási idő (hó/év) és szám: a flakonon található.

Eltarthatósági idő: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év


Nettó tartalom: 1 liter és 5 liter

Gyermekektől elzárva tartandó.

Sürgős esetben hívható telefonszámok:

Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 06-1-476-64-64 vagy ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-201-199 Budapest – *magyar* 24 órán keresztül elérhető. E.I du Pont de Nemours & Co., USA – *angol*: (1) 302-774-11-39

A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai



Figyelem

Tűzveszélyességi besorolás:

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

kifejezetten veszélyes.

nem jelölésköteles

p.o.LD50 patkányon: > 5000 mg/ttkg,

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P261	Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök permet belélegzését.
P280	Védőkesztyű/ védőruha/ szem/arcvédő használata kötelező.
P333 + P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edényzet elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Túlérzékenyítő komponensek SP 1	Tartalmaz: 2-Aminoszulfonil-N,N-dimetilnikotinamid / Allergiás reakciót válthat ki. A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést).
SPo 2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
SPe 2	A talajvíz védelme érdekében nem alkalmazható kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen és drénezett talajokon.
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Munkaegészségügyi óvrendszabályok: *egyéni védőfelszerelés*

*előkészítőknek és
kijuttatóknak* védőruha (4.típusú), védőkalap, védőszemüveg (3. típusú) vagy arcvédő, védőkesztyű (3.típusú), védőlábbeli.

Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, azonnal orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: rendeltetés szerű felhasználás esetén nincs korlátozás (>35 nap)

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Csomagolóanyag kezelés:

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

Vegye fel a kapcsolatot egy erre specializálódott és jogosítvánnyal rendelkező hulladék megsemmisítő vállalattal. **CSEBER Nonprofit Kft. 1024 Budapest Margit krt. 43-45. Tel: 1/340-48-88.**

Gyűjtőhelyek listája: <http://www.cseber.hu/gyh.php>



Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	A kezelések közti idő (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		az utolsó kezelés fenostádiuma
				szer (l/ha)	víz (l/ha)	
kukorica (áru és siló)	magról kelő és érelő egyszikű gyomfajok,	1	-	1,0-1,5	250-300	A kukorica 3-7 leveles állapot (BBCH 16-17)
	valamint magról kelő kétszikű gyomnövények	2	8-10	0,75+0,75	250-300	

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt a kukorica 3-7 leveles fenológiai állapotában kell kipermetezni, amikor a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 levelesek, az érelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korokban a legérzékenyebbek a készítményre.

Felhasználható önmagában 1,0-1,5 l/ha mennyiségben, vagy osztott kezelés formájában 0,75 l/ha + 0,75 l/ha dózissal. Osztott kezelés esetén a két kezelés időpontja között 8-10 napos eltérésnek kell lennie.

Erős Sorghum halepense (fenyércirok) fertőzés esetén amennyiben egyszeri kezeléssel alkalmazzuk 1,5 l/ha dózisban javasolt kijuttatni.

A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetésével egy menetben szerves foszforsav-észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek. Amennyiben a kukoricát állományban szerves foszforsav-észterrel kezelték csak a kezelést követő 7. nap elteltével végezhető a gyomirtás.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

A gyártó további hasznos tanácsai:

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Javasolt dózis, egyszeri kezelés esetén: kukoricában 1-1,5 liter/ha. Osztott kezelés esetén: 0,75+0,75 liter/ha.

Hatásmechanizmus:

A **Victus® 40 OD** hatóanyagai elsősorban a leveleken keresztül felszívódva fejtik ki hatásukat.

A hatóanyagok az acetolaktát-szintetáz enzimet gátolják, aminek hatására az érzékeny gyomokban a transzspiráció, a légzés és az anyagcsere a kezelést követő néhány órán belül leáll.

A gyomok növekedése és fejlődése rövid időn belül megáll, de a jellemző tünetek (elszínéződés, elhalás) a kezelést követő 3-10. napon válnak láthatóvá a gyomok növekedési körülményeitől függően.

A meleg, párás időjárás elősegíti a hatáskifejtést, míg a hideg és száraz körülmények késleltethetik a tünetek megjelenését.

Érzékeny gyomnövények:

-Évelő egyszikűek: *Sorghum halepense*-fenyércirok,
-Egyéves egyszikűek: *Echinochloa crus-galli*-kakaslábfű, *Panicum spp.*-vadköles, *Setaria glauca*-fakó muhar, *Setaria viridis*-zöld muhar, *Setaria verticillata*-ragadós muhar, *Digitaria sanguinalis*-pirók ujjasmuhar,
-Kétszikű gyomfajok: *Amaranthus retroflexus*-szőrös disznóparéj, *Amaranthus chlorostachys*-karcsú disznóparéj, *Sinapis arvensis*-vadrepce, *Galium aparine*-ragadós galaj, *Matricaria spp.*-szikfű fajok, *Raphanus raphanistrum*-repcsényretek, *Senecio vulgaris*-közönséges aggófű, *Stachys annua*-tarló tisztesfű.

Közepesen érzékeny gyomnövények:

-*Atriplex spp.*-laboda fajok, *Chenopodium spp.*- libatop fajok, *Xanthium spp.*-szerbtövis fajok, *Ambrosia artemisiifolia*-parlagfű, *Polygonum spp.*-keserűfű fajok (csak a magról kelők). *Datura stramonium*-csattanó maszlag, *Agropyron repens*-tarackbúza.

Ellenálló gyomfajok:

-*Solanum nigrum*-fekete ebszőlő, *Polygonum spp.*-keserűfű fajok, *Equisetum arvense*-mezei zsurló, *Convolvulus arvensis*-apró szulák, *Calystegia sepium*-sövényszulák, *Cirsium arvense*-mezei acat

Technológiai javaslat:

Kukorica

A **Victus® 40 OD** csak a már kikelt, ill. a kezelés idején kelő gyomok ellen hatásos.

A legjobb gyomirtó hatás eléréséhez a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a gyomok érzékeny, aktív növekedési stádiumban vannak. A legtöbb gyom csírázaskor és fiatal (egyszikűek 1-3 leveles, kétszikűek 2-4 leveles) korban a legérzékenyebb.

Törekedjen a permetezőgép pontos beállítására, kerülje el az alul, vagy felül dozírozást.

Ügyeljen a permetlé egyenletes eloszlására és törekedjen a minél nagyobb fedettség elérésére.

Kerülje el a szórókeretek átfedését.

Nem-ionos nedvesítőszer (pl. Trend® 90, 100 ml/100 l permetlé) hozzáadása mindig szükséges.

1.) *Sorghum halepense*-fenyércirok, *Agropyron repens*-tarackbúza

Amennyiben a terület a fent említett gyomokkal fertőzött, az első permetezést követően második gyomkeléssel kell számolni. Ezért ezeken a területeken osztott kezelést javasolt tervezni, azonban esetenként egy permetezés is elegendő lehet.

Időzítés:

Fenyércirok és tarackbúza ellen 15-20 cm-es fejlettségkor permetezzen!

Dózis

Egyszeri kijuttatás: 1,5 liter/ha **Victus® 40 OD**

Osztott kezelés esetén: 0,75+0,75 liter/ha

2.) *Echinochloa crus-galli* -kakaslábfű és egyéb egyéves egyszikű és érzékeny kétszikű gyomnövények ellen.

Egyszeri kijuttatás:

A kezelést az egyszikűek bokrosodásának kezdetéig, a kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotukban kell elvégezni 1- 1,5 liter/ha **Victus® 40 OD**

Osztott kezelés:

Az első kezelést az egyszikűek bokrosodása kezdetéig kell elvégezni!

Első kezelés: 0,75 liter/ha **Victus® 40 OD**

A második permetezést 8-10 nap múlva, a gyomok újrakelésének függvényében kell elvégezni!

Második kezelés: 0,75 liter/ha **Victus® 40 OD**

3.) *Panicum spp.*- köles fajok:

Egyszeri kezelés esetén-legkésőbb a gyökérváltásig-

Victus® 40 SC ajánlott dózisa, 1,0-1.5 liter/ha A köles ellen legjobb eredményt az *osztott kezelés* biztosít.

Első kezelés: a gyom kelését követően, amikor a gyomok átlagosan 2 leveles állapotban vannak.

Victus® 40 SC: 1.0 liter/ha Újabb gyomkelés esetén a fent említett gyomfejlettségénél, 0,5 liter/ha dózisban kell a permetezést megismételni.

Maximum dózis/kezelés 1,5 liter/ha.

Évente maximum 1,5 liter/ha juttatható ki (60 g nikoszulfuron hatóanyag).

Kombinációs lehetőségek:

Tankkeverék használat esetén a kijuttatáskor mindig kövesse a kombinációs partner címkéjének előírásait is.

Kétszikű gyomok elleni kombinációk:

A **Victus® 40 OD-t** (pl. *Chenopodium album*-fehér libatop, *Polygonum spp.*-keserűfű fajok, *Datura stramonium*-csattanó maszlag, *Ambrosia artemisiifolia*-parlagfű, *Xanthium spp.*-szerbtövis fajok, *Convolvulus arvensis*-apró szulák és *Solanum nigrum* -fekete ebszőlő) tankkeverék formájában ki kell egészíteni más hatóanyagú készítménnyel: például tifenszulfuron-metil, bromoxinil, 2,4-D, dikamba , mezotrion illetve terbutilazint tartalmazó készítmény.

A tankeverék partner használatára vonatkozólag mindig a tankeverék partner termék gyártójának ajánlásait vegye figyelembe.

Nitrogén műtrágya:

A permetléhez adott nitrogén műtrágya fokozza a **Victus® 40 OD** és kombinációi hatékonyságát számos gyomnövényen, és elősegíti a permetlé levelekbe történő behatolását, különösen kedvezőtlen, száraz időjárási viszonyok mellett. A **Victus® 40 OD** és a kétszikű gyomirtó készítmények között esetlegesen fellépő antagonizmust a hozzáadott nitrogén műtrágya megakadályozza. Javasolt dózis 28 %-os nitrogén oldat, mint pl. Nitrosol vagy UAN oldat 8-10 l/ha vagy szilárd jól oldódó és permetezhető műtrágya, mint pl. ammónium-szulfát, vagy ammónium-nitrát 3-4 kg/ha. A szilárd műtrágyákat előbb vízben oldja fel, majd állandó keverés mellett adja a permetléhez!

Mechanikai gyomirtás

A mechanikai gyomirtás, kapálás, kultivátorozás jól kiegészíti a vegyszeres védekezést a később kelő, vagy a kezelést túlélő gyomok irtásánál. Ne alkalmazzon mechanikai gyomirtást, kapálást, vagy kultivátorozást legalább 10 nappal a **Victus® 40 OD** -és kezelés előtt. A mechanikai gyomirtás, kapálás, kultivátorozás optimális ideje a kezelést követő 7-14. nap.

Tankkeverék készítésekor mindig végezzen keverhetőségi próbát!

Szelektivitás:

A **Victus® 40 OD** -t nem javasolt olyan kukoricában, felhasználni, amely szárazság, vízállás, alacsony hőmérséklet, rovarkártétel, tápanyag vagy mészhány, ill. egyéb a növény növekedését akadályozó tényező miatt stressz állapotba került.

A **Victus® 40 OD** szelektív gyomirtó szer az áru- és silókukorica 7 leveles fejlettségéig. Ne használja csemege kukoricában!

Kukorica:

Ha a kukorica stressz állapotba került a szélsőséges időjárás miatt, mint túl magas (+25° C fölötti), vagy túl alacsony (+10° C alatti) hőmérséklet, szárazság, tartós víznyomás, időlegesen érzékenyebbé válhat a **Victus® 40 OD**-vel szemben.

Egyes esetekben átmeneti fitotoxicitás (sárgulás, enyhén csavarodott levél) jelentkezhet.

A Pactol, Dolar, Occitan, Etalon hibridekben a **Victus® 40 OD** átmeneti fitotoxicitást okozhat, ezért felhasználása csak levél alá permetezéssel javasolt.

Pelikan és Alfa hibridek esetében a **Victus® 40 OD** 5 leveles fejlettségig használható.

A szulfonilurea rezisztens hibrideket - Occitan SUMO®, Furio SUMO® 7 leveles korukig lehet kezelni a **Victus® 40 OD**-vel.

A **Victus® 40 OD** + Refine® 50 SX® tankkeverék a kukorica 5 leveles állapotáig permetezhető ki.

A Pactol, Dolar, Occitan, Etalon, Alfa és Pelikan hibridekben a kombinációt nem javasolt felhasználni. Amennyiben új fajták kerülnek a piacra, a szelektivitással kapcsolatban kérje ki a DuPont, illetve a vetőmag tulajdonos véleményét mielőtt a **Victus® 40 OD** -t felhasználná.

Ha a kukorica stressz állapotban van vagy a javasolt fenológiai állapottól nagyobb, a **Victus® 40 OD**-t csak levél alá permetezéssel juttassa ki!

Talajtípus:

A talaj típusa a **Victus® 40 OD** hatékonyságát nem befolyásolja.

Esőállóság:

A **Victus® 40 OD** 4 órán belül felszívódik a növénybe.

Amennyiben a permetezést követő 4 órán belül eső esik, a készítmény hatékonysága csökkenhet.

Utóvetemény:

Kukorica:

A **Victus® 40 OD** a talajban gyorsan lebomlik, ezért a **Victus® 40 OD**-és kezelés után 90 nappal a legtöbb szántóföldi növény vethető. Az őszi árpa érzékeny a talajban maradó nikoszulfuronra, ezért a **Victus® 40 OD**-vel kezelt kukorica után, őszi árpát csak 90 nappal a kezelés után javasolt vetni.

Kertészeti, zöldség és dísznövény kultúrák vetése, telepítése előtt kérje ki a DuPont munkatársainak a véleményét.

Permetlé elsodródás:

Különösen ügyeljen, hogy a permetlé ne kerüljön a kezelt területen kívülre, illetve folyóvizekbe, állóvizekbe, vagy csatornákbá.

Kerülje el, hogy a permetlé szomszédos kultúrákra, vagy olyan területre sodródjon, ahová érzékeny kultúra kerül vetésre/ültetésre.

A nagyobb cseppméret alkalmazása csökkenti az elsodródás veszélyét, de nem akadályozza meg, amennyiben a kijuttatás nem megfelelő, vagy az időjárás nem kedvez a permetezéshez.

A magas hőmérséklet, szárazság, alacsony relatív páratartalom növeli az elsodródás veszélyét.

A kijuttatáshoz olyan szórófejet használjon, amely a permetezési paraméterek biztosítása (lémenyiség, fedettség) mellett az elsodródásra is kevésbé érzékeny. (Lechler AD- ID, TeeJet)

Permetlékészítés:

Mielőtt a **Victus® 40 OD**-vel permetezne, győződjön meg róla, hogy a permetezőgép tiszta, ki van mosva.

A permetlevet a következők szerint készítse el:

- töltse meg a permetező tankját 1/4részig vízzel,

- indítsa el a keverőt,

- adja a megfelelő mennyiségű **Victus® 40 OD**-t a tartályba, - folyamatos keverés mellett töltse fel vízzel a tartályt- majd

amennyiben a **Victus® 40 OD** más gyomirtó szerrel/szerekkel kombinációban kerül kipermetezésre, a kombinációs partnert adja a tartályba .

A permetezés alatt folyamatosan működtesse a keverő berendezést!

Javasolt lémenyiség: 200-300 l/ha.

A permetezőgép tisztítása:

A permetezőgépet és szerelvényeit a permetezést követően azonnal ki kell mosni, hogy elkerülje a kukorica/burgonya/paradicsom után kezelendő növény károsodását.

Mindig viseljen védőruhát a permetezőgép tisztítása során, illetve ne végezze a mosást zárt helyen.

Javasolt módszer a permetezőgép tisztítására:

1. A permetezést követően azonnal ürítse ki a tartályt! A permetezőgépen lévő külső szennyeződések tiszta vízzel mossa le!
2. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel és mossa át a szórókeretet, valamint a vezetékeket! Használjon a tartály legalább 10%-ának megfelelő vízmennyiséget!
Ürítse ki a tankot!
3. Töltse fel a tartályt félig vízzel, majd adjon hozzá annyi háztartási ammóniát (szalmiákszesz), hogy 1%-os koncentráció keletkezzen! (100 liter vízhez 1 liter háztartási ammóniát kell adni.)
 - Indítsa be a keverőt és öblítse át a szórókeretet, valamint a vezetékeket!
 - Tiszta vízzel egésszítse ki a tartályban lévő mosó folyadékot, úgy hogy a permetező teljesen fel legyen töltve!
 - Hagyja a mosó folyadékot a permetezőben állni -folyamatos keverés mellett - 15 percen keresztül!
 - Újból öblítse át a szórókeretet és a vezetékeket, majd ürítse ki a tartályt!
4. A szórófejeket és a szűrőket elkülönítve kell tisztítani a mosó oldattal, majd tiszta vízzel le kell öblíteni!
5. Ismétlje meg a 2. lépést!

Korlátozások:

A **Victus® 40 OD** csak mezőgazdasági termelésben használható!

Ne használja a **Victus® 40 OD**-ét kukoricán kívül más kultúrákban!

A permetezést ne végezze a nap legmelegebb óráiban (+25°C felett), vagy ha a hőmérséklet tartósan +10°C alá süllyed, mert néhány hibrid átmeneti fitotoxicitást mutathat!

A Pactol, Dolar, Occitan, Etalon hibridekben **Victus® 40 OD** fitotoxicitást okozhat, ezért felhasználása csak levél alá permetezéssel javasolt.

A permetezőzt használat előtt mindig kalibrálja be tiszta vízzel!

A permetező beállítását munka közben meghatározott időközönként ellenőrizze!

Törekedjen a készítmény pontos kimérésére és adagolására!

Csak annyi terméket keverjen be, amennyi a kezelni kívánt területre szükséges!

Kerülje el a tartály túltöltését és a permetlé elcorgását!

A felesleges permetlevet ne öntse ki, a címke előírásainak megfelelő módon és dózisban permetezze ki!

Ne tárolja a gyomirtó szert kutak közelében!

Rovarölő szer használatra vonatkozó korlátozások:

A DuPont™ **Victus® 40 OD** gyomirtó szer kölcsönhatásba léphet szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerekkel, melyet a kezelést megelőzően vagy tankkeverékben használunk fel a kultúrnövény védelmére. A kultúrnövény eltérően reagálhat erre a felhasznált vetőmag fajtája, rovarölő szer hatóanyaga, kijutási technológia, talajtípus és a környezeti tényezők függvényében.

Korlátozás: Ne használja a DuPont™ **Victus® 40 OD** gyomirtó szert szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel tankkeverékben! A gyomirtás és a szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel történő állománypermetezés között minimum 7 napnak kell eltelnie.

Rezisztencia kialakulásának lehetősége:

Az azonos hatásmechanizmusú herbicidek több éven át, ugyanazon területen való felhasználása természetes szelekció útján rezisztens biotípusok kialakulásához vezethet. A további egyoldalú gyomirtó szer felhasználás hatására a rezisztens biotípus felszaporodhat, majd a területen dominánssá válhat. Az adott gyom-biotípus akkor tekinthető rezisztensnek, ha a herbicid előírás szerű felhasználásakor, a javasolt dózis alkalmazása után a kezelést túléli. A rezisztencia kialakulása, illetve kifejlődése elkerülhető, vagy

késleltethető eltérő hatásmechanizmusú, de hasonló hatékonyságú gyomirtó szerek egymást követő, vagy tankkeverékben való kijuttatásával, illetve vetésváltással.

Árvakelésű ALS gátló herbicidekre toleráns napraforgó leküzdésére a **Victus® 40 OD**-ét kombinációban kell használni hormon típusú készítményekkel, mint dikamba, 2,4-D, klopíralid, stb.

Magyarországon ALS-rezisztens fenyércirok populáció leírásra került. Amennyiben ilyen gyom biotípus található az Ön területén, akkor ne alkalmazzon ez ellen a gyom-típus ellen ALS-gátló herbicidet önmagában. Alkalmazzon vetésváltást és eltérő hatásmechanizmusú készítménnyel védekezzen a kukoricában és egyéb növénykultúrákban.

Integrált növényvédelmi technológia

A termék beilleszthető az integrált növényvédelmi technológiába, ami magába foglalja a preventív biológiai, agrotechnikai beavatkozásokat a korrekt betegség és kártevő felismerést és megfigyelést, valamint az optimális időben végzett célzott kezelést, amikor a kártételi küszöb megkívánja.

Csomagolóanyag kezelés:

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, víztározókba, állóvizekbe juttatni !

A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni és a mosólevet a permetléhez adni. Az üres csomagolóanyagot - a magyar előírásoknak megfelelően - kell megsemmisíteni.

Tilos a csomagolóanyag bármilyen célú újra-felhasználása !

Raktározás:

Tartsa a készítményt eredeti, zárt csomagolásban, szabályos növényvédő szer raktárban!

Figyelmeztetés:

A **Victus® 40 OD**-t csak a használati utasításnak megfelelően javasolt felhasználni.

A DuPont garantálja, hogy e termék azonos a címkén leírtakkal és normál felhasználási viszonyok között megfelel a leírt céloknak. Fitotoxicitás, hatáscsökkenés vagy más, nem szándékolt eredmény bekövetkezhet olyan tényezők miatt, mint: időjárás, más anyagok jelenléte vagy a kivitelezés módja, mely tényezők kívül esnek a DuPont kontrollján és felelősségén.

A DuPont nem vállal felelősséget semmilyen, a termék - a DuPont ajánlásaitól eltérő - felhasználásából következő kárért, vagy károsodásért.

Ez esetekben a felelősség a felhasználót terheli.